Best's T

Vass7R05s346-350

Vass7R05s346-350

Vassal-Montpellier

Best's T 7 R5 & 346.350











NOM Best'S TN = Pougnet EMPLACEMENT 7 B 5 0 3 46 .350

Souche	Nbre yeux		rement mi/déb		Ferti- lité	Flo début	oraiso mi/f		Vé début	raisor mi/v		Maturité
1 2 3 4 5	4 4 5	23 3 23 3	293 - 1 243.	3 4	4,7	30,5	5.6	12.6	24.7	1,8	1,8	M,9 +5
21												

ATINEE 1990 013520 NOM Best's T = Lougnet EMPLACEMENT 7 R53. 346:350.

Souche	Nbre yeux		rement mi/déb		Ferti- lité		oraisc mi/f	4	Vé début	raisor mi/v		Maturité
2 3 4	4 4 6	\$.3 \$.3 \$5.3	19.3. 22.3. 19.3. 22.3. 22.3.	409	9	23.5	25,5 +5	28.5	30.7	4.8	8.8	10-9,90
Po	urritu:	re: () M:	111. :	0	Port	: Levi	ye	Vi	gueur	: 4	

Pourriture: 0 Mill.: 0 Port: 1 evigle Vigueur: 4

NOM Best's T EMPLACEMENT 7 Rg 5 & 346.350											
Souche Whre yeux	Débourrement début mi/déb	Ferti-	Ferti- Floraison Véraison lité début mi/f fin début mi/v					Maturité			
2 4 5 6 5 88	21,3 E9.3. 18,3 26.3. 15,3 18,3. 21,3 26.3. 153 26.3. 8 26.3. S1	4	Grappe Pour: Baie:	TC - (lisc-sy s B-(+ 8 M - P Mil G - M ph-ell Gr-Rs- m - a	Dim Dim Dov-ole Rg-N r - fe	Dim: Abov-cy:	Compa-	cité	40,9 +4 : L - N- C	

N° d'ordre :

Désignation : Emplacement : Best'A T 7R5 A, 346-350 (0.4)

(A) BOURGEONNEMENT

Epanoui 182) - moyen 183 - globuleux 184.

Glabre 185 - séteux 186 - velouté 187 - aranéeux 188 - duveteux 189 - cotonneux 190 - sans villosité pubescente 278 - sans villosité laineuse 279.

Blanc 191 - fauve ou roux 192 - carminé 193 - à liséré carminé 194 - jaune 195 - à plages bronzées ou cuivrées 196 - entièrement bronzée on cuivré 197 - vert 198.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

Etalées - en gouttière - autres.

Tace inférieure: glabres 199 - séteuses 200 - veloutées 201 - aranéeuses 202 - duveteuses 203 - cotonneuses 204 - sans villosité pubescente 280 - sans villosité laineuse 281.

Face supérieure : blanches 205 fauves ou rousses 206 - carminées 207 à liséré carminé 208 - jaune 209 - à plages bronzées ou cuivrées 210 entièrement bronzées ou cuivrées 211 - vertes 212 - autres 213.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2ème et de la 3ème feuille détachées sera notée).

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Face inférieure

Nervures: glabre 214 - séteux 215 - velouté 216 - aranéeux 217 - duveteux 218 - cotonneux 219 - sans villosité pubescente 282 - sans villosité laineuse 283.

Limba: glabre 220 - séteux 221 - velouté 222 - aranéeux 223 - duveteux 224 - cotonneux 225 - sans villosité pubescente 284 sans villosité laineuse 285.

A limbe plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Face supérieure

Blanc 226 - fauve ou roux 227 - carminé 228 - à liséré carminé 229 - jaune 230 - à plages bronzées ou cuivrées 231 - entièrement bronzées ou cuivrées 232 - verte 733.

A péticle glabre 234 - séteux 235 - velouté 236 - aranéeux 237 - duveteux 238 - cotonneux 239 - sans villosité pubescente 286 - sans villosité laineuse 287.

Totalement - sillon - partiellement.

_Calvo 88

N° d'ordre :

Désignation : Emplacement : Best's T' 7R52-346-350 (01)

idminuluntuuluutuulmituul

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

A contour uni - anguleux - côtelé. Glabre 242 - à épines ou analogues 243 - poils massifs 244 séteux 245 - velouté 246 - aranéeux 247 - duveteux 240 - cotonneux 241. sans villosité pubescente 288 - sans villosité laineuse 289. Entièrement - partiellement.

Mérithalle : dos coloré 248 - à raies 249 - vert 250.

ventre coloré 251 - à raies 252 - vert 253.

: dos coloré 254 - à raies 255 - vert 256. Noeuds

ventre coloré 257 - à raies 258 - vert 259. verte 260 - jaune 261 - rouge clair 262 - rouge foncé 263. Vrille

subcontinues - intermittentes.

très courte - courte - moyenne - longue - très longue.

: coloré 264 - vert 265. Bourgeon

(I) FLEUR

Bouton floral : gros - moyen - petit. Morphologiquement : mâle 4 - femelle 5 - hermaphrodite 6.

- Calvo 89

N° d'ordre :

Désignation :

Best's T 7- R5 346-350 (1.347)

Emplacement :

FEUILLE ADULTE

Petite 141 - moyenne 142 - grande 143.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre - séteux - velouté aranéeux - duveteux - cotonneux.

Face inférieure : nervures : glabre (144 - séteux 145 - velouté 146 aranéeux 147 - duveteux 148 - cotonneux 149 sans villosité pubescente 272 - sans villosité laineuse 273.

limbe : glabre (50 - séteux 151 - velouté 152 aranéeux 153 - duveteux 154 - cotonneux 155 sans villosité pubescente 274 - sans villosité laineuse 275,

Limbe : plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté. Lobes : plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté ;

Surface: unie 156 - ondulée 157 - finement bullée 158 - moyennement bullée [62] - grossièrement bullée 159 - gauffrée 160 plissée au point pátiolaire 161.

Nervures : Face supérieure : verte 163 - point pétiolaire rouge 164 partiellement rouge 165 - entièrement rouge 166.

> Face inférieure : verte 167 - partiellement rouge 168 entièrement rouge 169.

Couleur du limbe : vert clair - vert franc - vert foncé - autre.

PETIOLE

Long 170 - moyen (7) - court 172. Glabre (73 - séteux 174 - velouté 175 - sans villosité pubescente 276 sillon - partiellement - totalement. Coloré 176 - partiellement coloré 177 - vert 178. Aranéeux 179 - duveteux 180 - cotonneux 181 - sans villosité laineuse 277 partiellement - totalement.

Calvo 87

N° d'ordre :

Désignation :

TR5 s.346-350(0.2)

Emplacement :

GRAPPE

Grosse 68 - Moyenne 69 - Petite 70 (dimensions 45 x).

Lâche 71 - Moyenne 72 - Compacte 73.

A pédoncule non visible 74 - visible 75 - long 76.

A pédoncule herbacé 77 - mi-aoûté 78 - aoûté jusqu'à la première ramification 79.

Axe de la rafle coloré 80 - non coloré \$1.

Très grosse 82 - Grosse 83 - Moyenne 84 - Petite 85 - Très petite 86 de taille régulière irrégulière (dimensions : 17 x 16). De couleur blanc 87 - gris 88 - rose 89 - rouge 90 - noir 91 Très pruinée 92 - pruinée 93 - non pruinée 94. Coloration régulière - irrégulière. Forme : discoïde 95 - sphéroïde 96 - ellipsoïde 97 - ovoïde 98 troncovoïde 99 - obovoïde 100 - cylindroïde 101 fusiforme 102 - arquée 103 - autres 104. A jus incolore 105) - coloré 106. A ombilic très apparent - peu apparent. A section transversale : régulière (07) - irrégulière 108 - côtelée 109. Région ombilicale déprimée 110 - non déprimée [11]. A saveur neutre 1(12) - fade 113 - musquée 114 - aromatique 115 - foxée 116 herbacée 117 - spéciale 118. De séparation facile (égreneuse) - difficile. A pédicelle long 119 - moyen 120 - court 121. A pédicelle de couleur : verte 122 - rouge 123 - irrégulière 124. A bourrelet de couleur verte [25] - rouge 126 - irrégulière 127. A bourrelet évident 128 - peu apparent [29]. A pinceau : court 130 moyen 131 - long 132. A pinceau : coloré 100 non coloré 100. A peau fine 1(35) - moyenne 136 - épaisse 137. A pulpe charnue 138 - juteuse 139 - molle 140 - peu juteuse. Avec pépins - apyrène.

Calvo 87

nloatantantauluutualaalaal

DENOMINATION : EMPLACEMENT :

Best's T 7 R50-346-3500.1

SARMENT DE VIGNE

: long (1) - moyen (2) - court (3). : grêle (1) - moyen (2) - fort (3). : ramifié (1) - peu ramifié (2). Sarment : adhérente avec lenticelles (1) - résistante se Ecorce détachant en lames (2)). Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) autre (4). unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4).
pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).
glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils
massifs (4) - séteux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) -Surface duveteux (8) -cotonneux (9).
: entierement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3). Villosité : blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3). : aplatis (1) - effacés (2)/- globuleux (3) - saillants (4). Noeuds Mérithalle de longueur moyenne :40... cms. : gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) - marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8). uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4). : plus foncé (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3) marron clair (4) marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8). : pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3). ... : marron (1) - brun rouge (2) - gris (3). Yeux Cordon pétiolaire : étroit (1) - large (2) : saillant (1) - effacé (2).

: sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2)

rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

N° d'ordre : 0/35.10
Désignation : Best's T
Emplacement : 7 R5 s 346-350

: 1 - 2 - (3) Angle des nervures : 4 - 5 - 6 Sexe : 7-8-9 L_1/L_2 : (10) - (11) L2/L Nombre de lobes : 12 - 13 - 14 - 15 - 16Prof. sinus latéral Sup. : 17 - 18 - 19 - 20Prof. sinus latéral Inf. : 21 - 22 - 23 - 24Forme sinus pétiolaire : 25 - 26 - 27 - 28 - 29Fond sinus pét. ni en U ni en V : (266) Sinus pétiolaire ouvert : 267 Dent au fond du sinus pétiolaire : 30 Forme sinus latéral Sup. : 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39Fond sinus latéral Sup. en V : 268 - en U : 269 - autre : 270 : (271) Sinus latéral Supérieur ouvert : 40 - 41 : 42 - 43 - 44 Dents : forme Dents (angle) : 45 - 46 - (47) Angle du lobe terminal Sinus pét. (dégar. - gar. -1/2 dégar.): 48 - 49 - 50 Nbre dents du point pét. à L3 : 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58-: 60 - 61 - 62 Angle des nervures L3 L'3 : 63 - 64 - 65 - 66 - 67 Largeur du sinus pétiolaire

alantan luntuuluutuulantuul

Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction : vers S.P. - droit - vers lobe terminal

Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale

Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües